

Bævretop (*Exidia & Myxarium*)

Gummiagtige, flade til foldede eller topformede, saprotrofe basidiesvampe med på langs kløvede basidier, og oftest enrummede, pølseformede sporer der kan repetere; med hyfidier men ikke egentlige cystider; med øskner.

1. Frugtlegerne mørkt gråbrunt til sort 2
Frugtlegerne farveløst, gulligt, blegbrunt eller rødbrunt 4
2. Frugtlegerne tyndt og tiltrykt; på rødgran, mindre hyppigt på andre nåletræer, typisk på barken af nyligt væltede stammer. Sporer 11-14 x 4,5-5 μm , pølseformede; meget almindelig
. **gran-bævretop (*E. pithya*)**
Frugtlegerne top-eller pudeformet eller noget foldet; på bark og ved af løvtræer, sjældent på nåletræ. 3
3. Frugtlegerne først pudeformet, siden hjerneagtigt foldet, uden stokagtig del; sporebærende lag med få utydelige vorter. Sporer 11-15 x 3,5-4,5 μm , pølseformede; på dødt ved (især bark) af en lang række løvtræer, sjældent på nåletræ; meget almindelig **almindelig bævretop (*E. plana*)**
(forma lobata med 20-22 x 4-5 μm store sporer ikke på vist i DK)
Frugtlegerne først pudeformet, siden topformet med filtet stokagtig del; sporebærende lag med talrige, tydelige vorter. Sporer 12,5-16 x 3,5-5,5 μm , pølseformede; på dødt ved af løvtræ (især bark), overvejende på eg; almindelig
. **eg-bævretop (*E. glandulosa*)**
4. Frugtlegerne farveløst, hvidligt, gulligt eller blegbrunt, i det mindste i randen. 5
Frugtlegerne $\pm$ ensfarvet rødbrune. 8
5. Frugtlegerne op til 2 cm brede, men evt. sammenflydende, glinsende gennemsigtigt, hyalint til smudsig gulligt, med eller uden indre hvide ugenomsigtige gryn 6
Frugtlegerne ofte større, mat, gennemskinneligt, blåligt hvidt, gulligt eller lysebrunt, uden indre hvide gryn 7
6. Frugtlegerne med indre hvide ugenomsigtige gryn; sporer tydeligt allantoide, 12-15 x 8,5-12,5 μm ; kødets hyfer $\pm$ oppustede ved tværvægge. På døde grene og stammer af løvtræer; almindelig **klar bævretop (*M. nucleatum*)**
Frugtlegerne uden indre hvide gryn; sporer ovale til svagt pølseformede, 9-14 x 4,5-6 μm ; kødets hyfer ikke oppustede ved tværvægge. På løvtræ, meget sjælden eller overset og sammenblandet med ovenstående ***M. mesomorphum***
7. Frugtlegerne mælkehvidt, typisk med blålig tone, med $\pm$ glat rand. Sporer 15-20 x 4,5-6,5 μm , pølseformede; på døde stammer og grene af løvtræer, særligt bøg; almindelig **hvidlig bævretop (*E. thuretiana*)**
Frugtlegerne gulligt til lysebrunt, ofte mørkest i midten, med frynset rand. Sporer 10-14 x 3-4,5 μm , $\pm$ pølseformede; på døde stammer og grene af løvtræer, særligt birk; meget sjælden **brusk-bævretop (*E. cartilaginea*)**
8. På barkklædt dødt ved af nåletræer, særligt skovfyr. Sporer 11-13,5 x 3,5-4 μm , pølseformede; ret sjælden.
. **kandis-bævretop (*E. saccharina*)**
På bark og ved af løvtræer 9
9. På birk; frugtlegerne ret sejgt, gennemskinneligt. Sporer 12-14 x 2,5-3,5 μm , pølseformede; meget sjælden, men nok også overset **udbredt bævretop (*E. repanda*)**
På pil, bævreasp eller poppel; frugtlegerne blødt gelatinøst, gennemsigtigt 10
10. På levende og døde grene af pil; sporer 11-15 x 2,5-3,5 μm , pølseformede. Almindelig. **pile-bævretop (*E. recisa*)**
På bævreasp og poppel; sporer 16-24 x 3-5 μm , pølseformede. Meget sjælden ***E. brunneola***