

## Fløjlsfod (*Flammulina*)

1. Hat overvejende hvid til creme, men eventuelt med gullig til orangebrunlig midte. . . . . 2  
- Hat med gule til orangebrune farver. . . . . 3
2. Hat vedblivende hvid til creme; sporelængde/bredde > 2,0. Ikke påvist i DK. . . . . *F. velutipes* var. *lactea*  
- Hat med gullig til orangebrunlig midte; sporelængde/bredde i gns. 1,5-1,7. Ret sj. . . . . **rodslående fløjlsfod (*F. fenae*)**
3. På eller nær krageklo (*Ononis spinosa*). Ikke påvist i DK. . . . . *F. ononidis*  
- På løvtræ, sjældnere nåltræ . . . . . 4
4. Mange sporer > 10  $\mu\text{m}$  lange, sporelængde/bredde 2,3-3; lameller ret fjerne; på pil og poppel. Ret alm. . . . . *F. elastica*  
- Sporer < 10 lange, dog kan enkelte sporer fra 2-sporede basidier være over 10  $\mu\text{m}$  lange, sporelængde/bredde  $\leq$  2,4; lameller middel til tætte; på løvtræ, inkl. pil og poppel, sjældent på nåltræ. . . . . 5
5. Sporer 6-9,5 x 3-4  $\mu\text{m}$ , Q i gns. = (1,8-)2-2,4; oftest direkte på løvtræ, sj. nåltræ, kan være rodslående. Meget alm.  
. . . . . **gul fløjlsfod (*F. velutipes* var. *velutipes*)**  
- Sporer 6-7,5 x 3,5-4,5  $\mu\text{m}$ , Q i gns. = 1,5-1,7; (især) på poppelved, oftest rodslående. Ikke påvist i DK. . . . . *F. populicola*