



Begporesvamp og stilkporesvamp (*Datronia*, *Dendropolyporus*, *Polyporellus*, *Polyporus* s.l.)

Nedbrydere på træ- Molekylære analyser har vist at begporesvamp sandsynligvis hører hjemme i slægten *Polyporus*. Arten er derfor medtaget i nøglen, selv om den umiddelbart ikke ligner de øvrige arter

1. Frugtlegerne ustilket, bredt tilvokset substratet, med begsort hat. Sporer 8-12 x 3-4,5 µm; på løvtræ, især bøg, almindelig. **blød begporesvamp (*D. mollis*)**
Frugtlegerne stilket, hat med brunlige farver 2
2. Frugtlegerne grenet med en hat for enden af hver gren 3
Frugtlegerne ugrenede 4
3. Hatte med ± midtstillet stok, med stort underjordisk sklerotium. Sporer 7,5-10 x 3-4 µm; jordboende nær gamle løvtræer og stubbe, især bøg og eg; fremme midt på sommeren, sjælden
. **skærmformet stilkporesvamp (*D. umbellatus*)**
Hatte med randstillet stok se Tueporesvamp (*Grifola frondosa*)
4. Hat groft skællet i det mindste på midten 5
Hat glat, filtet eller fint indvokset skællet. 6
5. Stok ± midtstillet; hatskæl tottede, ± oprette; enkeltvist voksende, især på grene af løvtræer eller tilsyneladende jordboende (fra sklerotium). Sporer 10-16 x 4,5-6 µm; hist og her øst for israndslinien . **knoldet stilkporesvamp (*Polyporus tuberaster*)**
Stok normalt skævt- eller randstillet; hatskæl afrundede, normalt tiltrykte; oftest i større eller mindre grupper på stubbe og levende eller døde stammer af løvtræer. Sporer 14-17 x 5-6 µm; almindelig.
. **skællet stilkporesvamp (*Polyporus squamosus*)**
6. Stok vedvarende lyst brun; hat cirkulær med ± midtstillet stok 7
Stok hurtigt mørkt brun til sort; hat cirkulær eller uregelmæssigt nyreformet; stok midt- eller skævtstillet 8
7. Porer grove, 2-4 per mm; vækstperiode okt.-apr. Sporer 6-7 x 2-2,5 µm; på løvtræ; almindelig
. **vinter-stilkporesvamp (*Polyporellus brumalis*)**
Porer fine, 4-7 per mm; vækstperiode apr.-juli. Sporer 5-7 x 2 µm; på løvtræ, gerne fugtige steder; almindelig
. **forårs-stilkporesvamp (*Polyporellus ciliatus*)**
8. Hat glat til fedtet, skinnende kastaniebrun; hyfer uden øksner. Sporer 7,5-9 x 3,3-5 µm; på større liggende grene og faldne stammer af løvtræer især i fugtige habitater; sjælden. **kastaniebrun stilkporesvamp (*Polyporus badius*)**
Hat glat til filtet, næppe skinnende, lyst okker, rødbrun eller mørkt gråbrun; hyfer med øksner 9
9. På ± begravede grene eller tilsyneladende jordboende; hat fra begyndelsen lyst gråbrun siden mørkt gråbrun til umbra. Sporer 7-9(10) x 3-4 µm; i skove og krat på kalkbund; sjælden . . . **sortfodet stilkporesvamp (*Polyporus melanopus*)**
På forskellige typer af dødt ved ofte tydelig hævet over skovbunden, også i knasthuller på levende træer; hat creme, lyst okker, læderbrun eller rødbrun 10
10. Stok ± midtstillet; hat rødbrun med tyndt filtet lag, efterhånden dybt tragtformet og glat. Sporer 7-9 x 3-3,5 µm; på døde grene af løvtræer, fx pil og hassel, gerne uden jordkontakt, i meget fugtige biotoper; ret sjælden, kun kendt Midt-Vest-og Nordjylland.. . . . **trompet-stilkporesvamp (*Polyporus tubaeformis*)**
Stok normalt skævt eller randstillet, hvis midtstillet er frugtlegerne normalt meget små; hat creme, lyst okker eller læderbrun, ikke dybt tragtformet. Sporer 8,5-11 x 3-3,5 µm; på dødt ved af forskellige løvtræer, også i knasthuller på levende træer; meget almindelig **foranderlig stilkporesvamp (*Polyporus varius/leptocephalus*)**