


# Skema over slægtskarakterer hos vigtige/større grupper af lamelsvampe


Ved slægtsinddeling er farven på et sporekast, tilstedeværelsen og udseendet af diverse svøb, lameltilhæftningen samt økologien vigtige makrokarakterer (tomt felt = ÷).

Blandt de vigtige mikrokarakterer finder man bl.a. typer af cystider samt sporeornamenter (intet nævnt = glatte sporer og ingen cystider).


© Jens H. Petersen, 2018




frie lameller



smalt og bredt tilvoksede lameller



udrandede lameller



kort og langt nedløbende lameller



lamellerne mødes i et nav om stokken

	fællessvøb	lamelsvøb	ring	lameller	økologi	andet makro	mikro
<b>hvid-gulligsporede</b>							(intet nævnt = glatte sp.; ÷ cy.)
østershatte	÷+			nedløbende	nedbrydere	± sidestillet stok; på træ	sporestøv hvidt til gråviolet
tragthatte				nedløbende	nedbrydere	små til store	
navlehatte				nedløbende	nedbrydere	små, skrøbelige	
huesvampe				smalt tilvoksede til nedløbende	nedbrydere	mest små, skrøbelige	sporer ofte amyloide
vokshatte				smalt tilvoksede til nedløbende	nedbrydere eller ?	med tykke lameller	basidier meget slanke
sneglehatte	+	÷+		± nedløbende	ektomykorrhiza	med fnugget stoktop	
ridderhatte	÷+	÷+	÷+	± udrandede	ektomykorrhizadannere		
gråblade				± udrandede	±ektomykorrhizadannere		
munkehatte				± udrandede	nedbrydere	stok ofte dunet-stribet	med spidse cystider
hekseringshatte				± udrandede	nedbrydere	ofte med parfumeret lugt	sporer vortede
fagerhatte	÷(+)			± udrandede	nedbrydere		
honningsvampe	+	+	÷+	udrandede til nedløbende	nedbrydere	store, på eller nær træ	
ametysthatte				udrandede (nedløbende)	ektomykorrhizadannere	med tykke, fjerne lameller	sporer vortet-piggede
fladhatte				smalt til bredt tilvoksede	nedbrydere		med cystider
bruskhatte				smalt til bredt tilvoksede eller med nav	nedbrydere	tørketolerante	med cystider
grynhatte	+ (grynet)	(+)	+	smalt tilvoksede	nedbrydere	grynede	sporer evt. amyloide
fluesvampe	+ (hudagtigt, med pose)	÷+	÷+	frie (til smalt tilvoksede)	ektomykorrhizadannere		sporer ofte næsten runde og evt. amyloide
snekkehatte	÷+ (slimet)	+		frie	nedbrydere	med mellugt	
parasolhatte m.fl.	÷+ (evt. pudret)	÷+	÷+	frie	nedbrydere	ofte grynede eller småskællede	store arter evt. med sporer med spirepore
skørhatte				tilvoksede (sjældent nedløbende)	ektomykorrhizadannere	sprøde i kødet	sp. amyloide, ornamenterede
mælkehatte				tilvoksede til nedløbende	ektomykorrhizadannere	sprøde i kødet, med mælk	sp. amyloide, ornamenterede

	fællessvøb	lamelsvøb	ring	lameller	økologi	andet makro	mikro
<b>rosasporede</b>							(intet nævnt = glatte sp.; ÷ cy.)
skærmhatte				frie	nedbrydere	mest på træ	ofte med sære cystider
posesvampe	+ (hudagtigt, med pose)			frie	nedbrydere		med cystider
rødblade				tilvoksede, udrandede til nedløbende	mykorrhiza & nedbrydere		sporer kantede
troldhatte				tilvoksede, udrandede til nedløbende	nedbrydere (parasitter)		sporer vortede
melhatte				nedløbende	nedbrydere	hvidlige, med stærk mellugt	sporer længdekantede
<b>sortsporede</b>							
champignoner	÷(+)	+	+	frie	nedbrydere	ofte ret kraftige	ofte med små cystider
blækhatte	÷+	+	÷+	frie	nedbrydere	lameller henfalder	med cystider, sp evt.vortede
hjulhatte				frie (ultrafrie)	nedbrydere	lameller krøller	sporer med ± sære former
mørkhatte	+	÷+	(+)	smalt tilvoksede	nedbrydere	ofte ret spinkle og skøre	med cystider, sp evt.vortede
nøgenhatte		÷		smalt til bredt tilvoksede	nedbrydere	lameller marmorerede	med cystider
glanshatte	÷+			smalt tilvoksede	nedbrydere	lameller marmorerede	med cystider
svovlhatte	+	÷+	+	smalt til bredt tilvoksede	nedbrydere	evt. gullige	med gule cystider
bredblade	+ (slimet)	+	+	smalt til bredt tilvoksede	nedbrydere	evt. grønne	med gule cystider
slimslør	+ (slimet)	÷+ (slimet)	÷+	langt nedløbende	parasitter?	sprøde i kødet	med store cystider
<b>brunsporede</b>							
skælhatte	+	÷+	÷+	tilvoksede til udrandede	nedbrydere	mest på træ	med ± gule cystider
gulhatte				smalt tilvoksede	nedbrydere	fedtede, spinkle og skøre	med cystider
agerhatte		÷+	÷+	bredt tilvoksede	nedbrydere	hat helt uden struktur	med cystider
knaphatte	+	÷+		smalt tilvoksede	ektomykorrhizadannere	ofte i med el	med cystider; sporer vortede
keglehatte				smalt tilvoksede	nedbrydere	stok ofte dunet-stribet	med cystider, sp. evt. vortede
dansehatte	÷+	÷+	÷+	smalt tilvoksede	nedbrydere	stok ofte dunet-stribet	med cystider
hjelmmhatte	÷+	÷+	÷+	smalt til bredt tilvoksede	nedbrydere, ofte i mos	ofte huesvampagtige	med cy.; sp. glatte til vortede
fnughatte	+	÷+	(+)	bredt tilvoksede	nedbrydere		med cystider
trævlhatte	÷+	÷+		smalt tilvoksede til udrandede	ektomykorrhizadannere	ofte med kvalmende (spermatiske) lugte; sporer ± gråbrune	med (krystal-) cystider; sporer glatte, vortede til stjerneformede
tåreblade	÷+	÷+	(+)	udrandede	ektomykorrhizadannere	ofte med ræddike- eller jordagtige lugte; sporer ± gråbrune	med cystider; sporer vortede
slørhatte	+ (evt. slimet)	+ (evt. slimet)	(+)	udrandede	ektomykorrhizadannere	sporer rustbrune	sporer vortede
netbladhatte				langt nedløbende	ektomykorrhizadannere	sprøde i kødet	med cystider