

Skørhat (*Russula*) er en slægt af ret kraftige lamelsvampe med sprødt kød og sporer med amyloidt ornament (se altid sporerne i Melzers reagens). Sporestøvet er hvidt til orangegult.


Skørhatte danner ektomykorrhiza. Nogle arter kan vokse med mange forskellige træer, mens andre er ret snævert knyttet til bestemte træslægter. Det er derfor altid vigtigt at notere sig, hvilke ektomykorrhizadannende træer og buske, der er i nærheden.

LIGNENDE GRUPPER:

– mælkelatte har også sprødt kød og sporer med amyloidt ornament, men de udskiller saft, når kødet såres; se s. 224.

– netbladhatte og slimsløv er tykkedede med sprødt kød, men har brune til sorte sporer; se s. 544 & 362.

Hos skørhattene er det nødvendigt at aflæse sporefarven meget præcist for at komme i mål med beskæmmelser. Nogle forfattere opererer med hele ti sporefarver – her nøjes vi med nedenstående fire. Sporefarven kan kun vurderes sikkert ved hjælp af et sporekast (se s. 25).

[illegible]

hat ± lædergul
til honninggul;
rand kamfuret;
lugt ofte ubehagelig

smag mild;
hat med brune,
grårosa, grålige eller
grønligte farver

smag mild
til moderat skarp; med
gullige til rødlige farver

rosensjørhatte
nøgle E

giftskørhatte
nøgle F

smag
udpræget skarp

SPOREKAST HVIT TIL CREM
SPOREKAST LYST CREMEGULT

mild; med lugt af
skaldyr; stok brunende
– grøn med FeSO_4

smag mild
til moderat skarp

smag
udpræget skarp

abrikosskørhatte
nøgle H

chiliskørhatte
nøgle I

tragtskørhatte
nøgle A

hat hvidlig,
± tragtformet;
kød ikke
rødmende
eller sortnende

hat grålig til
brunlig;
kød rødmende
og/eller sortnende

SPOREKAST HVIDT TIL CREME
SPOREKAST HVIDT TIL ORANGEGULT

KUN MED LANGE LAMELLER
M. KORTE OG LANGE LAMELLER

M. KORTE OG LANGE LAMELLER

Skørhatte
er sprøde
lamelsvampe
uden mælkesaft

No. 1.

2.

-

- 

-



1. *Russula pseudodelicia* er beskrevet af Jacob E. Lange fra Fyn i 1926. De finere detaljer vedrørende sporemorphologien er desværre ukendte, og det er derfor uvist, om arten er forskellig fra *R. pallidospora* fra 1967.

- 

— 7. Lameller ret tykke og fjerne, gerne med et voksagtigt udseende; stoktop fint fnugget, eventuelt med vandklare dråber hos unge eksemplarer; sporer med isolerede vorter. Hat 30-80 mm bred; lugt frugtartig;

— 7. Lameller ret tykke og fjerne, gerne med et voksagtigt udseende; stoktop fint fnugget, eventuelt med vandklare dråber hos unge eksemplarer; sporer med isolerede vorter. Hat 30-80 mm bred; lugt frugtartig;

smag meget skarp; sporer 6-8 x 5-7 µm, med op til 0,8 µm høje, isole-
rede vorter; i løvskove og parker på bedre jordbund; hist og her, men
næsten fraværende vest for israndslinjen

gul kam-skørhat (*Russula farinipes*)
Lameller normalt tykke og fjerne, næppe voksagtige; stoktop hverken
frugget eller med vandklare dråber; sporer eventuelt med forbundne
vorter

8. Med svag lugt af camembert
hvid form af skarp kam-skørhat (*Russula amoenolens*), se pkt. 12
Lugt anderledes eller manglende se giftskørhatte, F3

9. Smag mild, lidt skarp eller lidt bitter
Smag udpræget skarp, i hvert fald efter nogle sekunder

10. Stokbasis med gult skær, rød med base (ammoniak eller KOH); hatrand
eventuelt med slørrester. Hat 30-80 mm bred; sporer 6,5-8 x 5,5-7 µm,
med op til 1 µm høje, noget forbundne vorter; lugt som camembert eller
svagt frugtagtig; smag mild; sporefældning cremegul; med løvtræer,
især i parkmiljøer; sjældnen eller overset, ikke vest for israndslinjen

gulfodet kam-skørhat (*Russula insignis*)
Stokbasis ± rustpletet, men ikke gul og ikke rød ved tilsætning af
base; basalt mycelium næppe gult; hatrand aldrig med slørrester. Hat
30-80 mm bred; sporer 7-8,5 x 6-7 µm, med op til 0,7 µm høje, noget
forbundne vorter; lugt ubehagelig af fisk eller gummistøvler; smag
mild til bitter, snerpende eller ubehagelig madolieagtig; sporefældning
creme; med løvtræer, især i parker med eg; almindelig, dog sjældnere
mod vest

mild kam-skørhat (*Russula recondita*)

11. Hat med dæmpede grå- til mørkebrune farver; lugt fravæ-
rende eller camembert- eller frugtagtig
Hat domineret af ret livlige okkerbrune, gulbrune til orangebrune
farver; lugt harsk eller madolieagtig, stærk og ± ubehagelig

12. Hat 30-70 mm, hatcentrum påfaldende glat, udefter radiærfuret over
lamellerne; med tydelig camembertlugt; sporer med op til 0,8 µm
høje vorter; guajak-reaktion øjeblikkelig og dybt grønblå
Sporefældning creme; sporer 7-8,5 x 5-6,5 µm; med løvtræer, især eg, på
mager (og leret?) bund; hist og her

skarp kam-skørhat (*Russula amoenolens*)
Hat 40-120 mm, hatcentrum fint rynket og radiært fibret, udefter ra-
diærfuret over lamellerne; lugt ubetydelig, eventuelt svagt frugt- eller
svagt camembertagtig; sporer med op til 0,4 µm høje vorter; med mo-
derat grøn reaktion med guajak. Sporefældning creme; sporer 6,5-
8,5 x 5,5-7 µm; med løvtræer, overvejende eg på lerbund; ret sjælden,
især mod øst

brun kam-skørhat (*Russula sororia*)

13. Stokbasis rustpletet; stok op til 60 x 20 mm. Hat 35-85 mm bred; sporer
7-9 x 5,5-6,5 µm, med lidt forbundne vorter; sporefældning creme; i
løvskov; meget sjælden
Russula pectinata
Stokbasis næppe rustpletet; stok op til 120 x 30 mm

14. Stok og kød ikke eller kun lidt gulnende med KOH eller NaOH; sporer
bredt ellipsoidiske til næsten-kugleformede, 7,5-10 x 7-8,5 µm, med op til
1,5 µm lange, ± isolerede pigge. Hat 50-150 mm bred; smag skarp, ubeha-
gelig; lugt komplekst krydret, olieagtig og generelt ubehagelig; sporefæld-
ning creme; i løv- og nåleskov, især med bøg; almindelig, men sjælden vest
for israndslinjen

stinkende kam-skørhat (*Russula foetens*)
Stok og kød livligt brunende eller gulnende med stærk (10 %) KOH eller
NaOH; sporer næsten-kugleformede, 7-9,5 x 6-7,5 µm, med op til 0,8 µm
høje, ± isolerede vorter. Hat 50-150 mm bred; smag skarp; lugt komplekst
krydret, sødlig, olieagtig og generelt ubehagelig; sporefældning creme;
med løvtræer, måske især med birk; ret sjælden eller overset, ikke kendt
vest for israndslinjen

honninggul kam-skørhat (*Russula subfoetens*)

Nøgle D – jadeskørhatte
Smag mild; sporefældning hvid til creme; hat overvejende med grønne,
brune, blålige eller brunviolet farver

1. Lameller hyppigt og ret regelmæssigt gaffelgrenede og ofte ± forgre-
nede nær stokken; hathud med tykvæggede, lange, spidse brune eller
farveløse hår, især omkring hatmidten; sporer under 7 µm lange. Hat 50-
100 mm bred, ± lysegrøn; lameller ret bløde og bøjelige; lugt ubetydelig;
sporefældning hvid; sporer 5-7 x 4-5,5 µm, med lave, noget forbundne
vorter; i løvskov og parker; hist og her, sjælden vest for israndslinjen

gaffelbladet skørhat (*Russula heterophylla*)
Lameller højest sparsomt og uregelmæssigt gaffelgrenede; hathud med
eller uden tykvæggede hår; sporer oftest længere

2. Hathud som ung nærmest voks- eller stearinagtig (lup!), senere fint
melet til kornet, som udvokset opsprækkende i små felter
Hat glat til fint melet, dugget eller filtet, næppe opsprækkende i tyde-
lige felter

3. Lameller ret bløde og noget fedtede at røre ved, brækker ikke let; hat
grårosa, violet til grågrøn
Hat op til 150 mm bred;
lugt ubetydelig; FeSO₄ på stokoverfladen fraværende til let grønlig,
sjældent lidt rødorange; sporefældning hvid; sporer 6,5-8,5 x 5,5-7 µm,
med lave, noget forbundne vorter; i løvskove og parker; meget sjæl-
den

sprukken skørhat (*Russula cutefracta*)
Lameller ± sprøde; hat typisk rent grøn

4. Sporefældning hvid til lyst creme
stok 20-40 mm tyk, ty-
pisk tøndeformet og fast; uden hatcystider. Hat 50-150 mm bred; lugt
ubetydelig; FeSO₄-reaktion først ± rødlig, derefter langsomt grågrøn;
sporer 6,5-8,5 x 6-7 µm, med meget lave vorter eller et lavt net; på leret
bund i løvskov; hist og her i Østdanmark

spanskgrøn skørhat (*Russula virescens*)
Sporefældning dybt creme
stok 10-22 mm tyk, ± cylindrisk,
± blødkødet; med hatcystider, der farves gråsorte i sulfovanilin

5. Sporer med isolerede vorter
se ande-skørhat (*Russula anatina*), pkt. 23
Sporer med noget forbundne vorter. Hat 30-70 mm bred; lameller ±
sprøde; sporer 6,5-8,5 x 5,5-7 µm; smag mild; lugt ubetydelig; med pop-
pel og muligvis også birk; meget sjælden

sortgrøn skørhat (*Russula atroglauc*)

6. Stok ± lædergul eller med alderen brunende nedefra
Stok med alderen ikke påfaldende lædergul eller brunende nedefra,
men eventuelt med spredte, brunlige pletter ved basis

7. Frugtleger store og kraftige; stok med alderen brunende nedefra;
basis rød med KOH; sporer 8-11 x 6,5-9,5 µm
se knippe-skørhat (*Russula viscida*), E19
Frugtleger små til middelstore; stok lædergul til okkerbrun med
alderen; basis ikke rød med KOH; sporer mindre

8. Hat, lameller og stok med alderen tydeligt ± lædergult
anløbende;
mest på fugtig bund med nåletræer eller birk, men også på tør morbund med
bøg; smag helt mild; sporer 7-9 x 5,5-7 µm, med noget forbundne vorter
se gulstokket skørhat (*Russula puellaris*), E11
Stok med lædergule pletter med alderen, hat og lameller næppe an-
løbende; på ± tør bund med birk, ofte i plæner; smag en anelse skarp;
sporer 6-9 x 5-6,5 µm, ofte påfaldende aflange, med noget forbundne
vorter
se foranderlig skørhat (*Russula versicolor*), I20

9. På fugtig bund med birk, ofte i tørvemos (*Sphagnum*); hatrand meget
kamfuret
se tørvemos-skørhat (*Russula robertii*), E16
Ikke med birk i tørvemos; hatrand ikke eller kun let kamfuret



10. Hathuden når typisk ikke helt ud til randen; hatmidte med spidse, tykvæggede, brunlige hår (mikroskop!). Hat 50-100 mm bred; lameller ret bløde og bøjelige; sporer 6,5-8 x 5-6 µm, med små, stort set isolerede vorter; lugt ubetydelig; sporefældning hvid; i løv- og nåleskove; meget almindelig
spiselig skørhat (*Russula vesca*)
Hathuden når helt ud til hatranden; hathud med eller uden brune hår . 11

11. Hat ± kanelbrun (☐), ret ensfarvet; med nåletræer. Hat 50-120 mm bred; lugt ubetydelig; sporer 7-10,5 x 5,5-8 µm, med lave, noget forbundne vorter; med nåletræer; meget sjælden, især Nordsjælland og Bornholm.
brun skørhat (*Russula mustelina*)
Hat anderledes farvet, ensfarvet eller broget; med løvtræer . 12

12. Lameller bløde, brækker ikke ved nulring; FeSO₄-reaktion på stokoverfladen fraværende til let grønlig; sporefældning hvid (☐). Hat 50-150 mm bred; lugt ubetydelig; sporer 7-9 x 6-7,5 µm, med stort set isolerede vorter; i løvskov; almindelig, dog hist og her vest for israndslinjen.
broget skørhat (*Russula cyanoxantha*)
Lameller moderat bløde eller skøre, brækker ved nulring; FeSO₄-reaktion på stokoverfladen ± rødlig eller blegt orange, efter nogen tid eventuelt grågrønlig; sporefældning hvid, creme til lyst cremegul (☐). 13

13. Hat overvejende purpur, mørkviolet, brunviolet til purpurbrun (☐). Hat anderledes farvet, eventuelt broget med iblandede violette nuancer. 14
Hat anderledes farvet, eventuelt broget med iblandede violette nuancer. 17

14. Med gran (eventuelt også med ceder og lærk). Hat 30-80 mm bred; lugt ubetydelig; sporer 8-10 x 7-8 µm, med lave, lidt forbundne vorter; sporefældning hvid; i skove på sur bund; DK? ***Russula azurea***
Med løvtræer . 15

15. Hat afblegende i bleggullige pletter; stok ofte noget grånende
se purpurbroget skørhat (*Russula undulata*), F29
Hat meget ensartet farvet; stok ikke grånende . 16

16. Hatoverflade stedvist kornet (lup!); sporefældning hvid eller lyst creme (☐); stok 20-50 mm høj
se lilla skørhat (*Russula lilacea*), E4
Hatmidte ikke kornet; sporefældning creme (☐); stok 30-70 mm høj. Hat 30-70 mm bred; lugt ± frugtagtig; sporer 7-9 x 6-7,5 µm, med op til 2 µm lange, stort set isolerede pigge; i løvskov; hist og her, men næsten fraværende vest for israndslinjen
brunviolet skørhat (*Russula brunneoviolacea*)

17. Hatoverflade dugget; sporer med lave, netagtigt forbundne vorter; stok med svag og langsom reaktion med guajak. Hat 30-80 mm bred; sporer 6-8 x 5-6,5 µm; lugt ubetydelig; sporefældning creme; i parker og løvskov, især med bøg og eg; ret almindelig, dog sjældnere mod vest
blågrå skørhat (*Russula parazurea*)
Hatoverflade glat/skinnende eller fint filtet; sporer med lave isolerede eller moderat forbundne vorter; guajakreaktion ofte tydeligt blågrøn. 18

18. Hat flammet med både lilla og grønne farver (☐), eventuelt afblegende til cremegrå; stok ofte med violette eller grønne strejf . 19
Hat ret ensfarvet med grågrønne, græsgrønne, gulgrønne til olivengrønne farver (☐), dog eventuelt med blegere rand; stok helt overvejende hvid, dog eventuelt med brune pletter ved basis . 21

19. Hat hurtigt afblegende til ± cremegrå men ofte stedvist med grågrønne partier (☐). Hat 40-65 mm bred; lugt ubetydelig; sporefældning creme; sporer 6,5-8,5 x 5-6,5 µm; med løvtræer på kalkbund; DK?
Russula galochroa
Hat mere udpræget grøngrå, lilla eller lysegrønne farver (☐). 20



20. Stok med strejf af lilla eller lysegrønt; hathudshyfer ofte med ret korte og lidt opsvulmede celler og nogle med ret kort endecelle; sporefældning lyst creme (☐); guajak-reaktion langsom og moderat. Hat 40-70 mm bred; lugt ubetydelig; sporer 6,5-7,5 x 4,5-6 µm; med løvtræer, mest med bøg i parker; hist og her
violetgrøn skørhat (*Russula ionochlora*)
Stok hvid; hathudshyfer ofte med ret lange celler og generelt med lang endecelle; sporefældning mørkt creme (☐); guajak-reaktion intenst grøn-blå. Hat 50-110 mm bred; lugt ubetydelig; sporer 6,5-8 (-9) x (5-) 5,5-6,5 µm; med løvtræer, mest med eg; almindelig, dog sjældnere mod vest
grålig skørhat (*Russula grisea*)²

21. Hat meget lille, op til 30 (-40) mm bred; lameller påfaldende fjerne; sporer 7,5-10 x 6,5-9 µm, med op til 1 µm lange, isolerede pigge. Sporefældning lyst creme; med løvtræer på lerbund; meget sjælden og østlig
lillebitte slørhat (*Russula immocua*)
Hat middelstor til stor; lameller ikke påfaldende fjerne; sporer med lave og oftest delvist forbundne vorter . 22

22. Hat ± filtet (lup!); reaktion med FeSO₄ på stokoverfladen højest svagt rosa, tillige ofte grågrønlig. Hat 40-120 mm bred; sporefældning creme; sporer 6,5-8 x 6-7 µm, med lidt forbundne vorter; med løvtræer på kalkholdig eller leret bund; meget sjælden og østlig
ande-skørhat (*Russula anatina*)
Hat voksagtig eller skinnende; reaktion med FeSO₄ på stokoverfladen tydeligt blegorange til rosabrún . 23

23. Hat blegt gulgrøn (☐), afblegende til creme (☐) i randen; denne længe indrullet; hathudens hyfeender 8-12 µm brede; celler overvejende kugleformede til bredt ellipsoidiske. Hat 40-100 mm bred; sporefældning creme; sporer 6,5-8 x 5,5-6,5 µm, med noget forbundne vorter; med bøg; meget sjælden
olivengrå skørhat (*Russula faustiana*)
Hat græsgrøn til grågrøn eller olivengrøn, midte eventuelt afbleget; hathudens hyfeender ikke over 9 µm brede . 24

24. Hat ofte noget rustpletet; med birk eller nåletræer, ofte på ret mager bund; hatcystider 4-6 (-7) µm brede, meget lange og cylindriske, eventuelt med et lille hoved. Hat 40-100 mm bred; lugt ubetydelig; sporefældning creme; sporer 7-8,5 x 5,5-7 µm, med noget forbundne vorter; almindelig
græsgrøn skørhat (*Russula aeruginea*)
Hat normalt ikke rustpletet; med løvtræer på kalkbund, især med bøg eller eg; hatcystider 5-9 µm brede, ret korte, kølleformede eller tilspidsede . 25

25. Sporer med meget små, op til 0,2 µm høje vorter. Hat 40-100 mm bred; lugt ubetydelig; sporefældning creme; sporer 6,5-8,5 (-9) x 5,5-6,5 (-7) µm, med stort set isolerede vorter; med løvtræer, måske især eg på kalkbund; DK?
Russula sublevispora
Sporer med klart højere vorter . 26

26. Med eg, bøg og ædelgran; sporer med ret forbundne vorter, til tider næsten zebrastribede. Hat 30-80 mm bred; lugt ubetydelig; sporefældning creme; sporer 6,5-8 x 5,5-6,5 µm, med noget forbundne vorter; meget sjælden
grågrøn skørhat (*Russula pseudoaeruginea*)
Med poppel og birk; sporeornament af isolerede eller kun lidt forbundne vorter . 27

27. Sporernes gennemsnitlige længde op til 6,5 µm, med stort set isolerede vorter; sporefældning dybt creme til lyst cremegul (☐). Hat 35-50 mm bred; sporer 5,4-7,7 x 4,6-5,7 µm; ej DK
Russula subterfucata
Sporernes gennemsnitlige længde over 7 µm, med noget forbundne vorter; sporefældning creme (☐). Hat 40-90 mm bred; sporer 6,5-8 x 5-6 µm; status usikker
Russula stenotricha



2. Der hersker udbredt forvirring om dette artspar. Romagnesi beskrev *R. ionochlora* som violet og grøn. Han beskrev og neotypificerede samtidig *R. grisea* Fr. som en gråviolet art. Einhellinger (1987) bragte imidlertid et billede af en violet og grøn art under navnet *R. grisea*. Denne nøgle bringer Romagnesis oprindelige tolkning.

Nøgle E – rosenskorhatte

Smag mild; sporefældning hvid til creme; hat overvejende med hvidlige, creme, gule, røde eller rødviolette farver.

- 
1. Med fiskelugt, i hvert fald hos ældre eksemplarer; stok i reglen med violette til vinrøde () områder 2

Uden fiskelugt; stok med eller uden violet eller vinrødt 3

2. Kød meget hårdt; stok med alderen med violette til lyst vinrøde () strejf; hat gul til grønligt gul (), ofte med purpur strejf; hathudshyfer med stærkt opsvulmet, næsten-kugleformet basalcelle. Hat 40-80 mm bred; stok oftest tilspidset nedefter; sporefældning creme; sporer 7-9 x 6-7,5 µm, med til 0,8 mm høje, meget forbundne vorter; især i løvskov og overvejende med bøg; hist og her, næsten fraværende vest for israndslinjen **ferskengul skørhat (Russula violeipes)**

Kød ikke særligt hårdt; stok med vinrøde () områder; hat med smudsig violet eller olivengrønne () farver (lidt å la purpurbroget eller Romells skørhat); hathudshyfers basalcelle højst en anelse opsvulmet. Hat 30-80 mm bred; stok oftest tilspidset nedefter; sporefældning creme; sporer 6,5-8 x 6-7 µm, med op til 1 µm høje, meget forbundne vorter; med løv- og nåletræer; meget sjælden **skønfodet skørhat (Russula amoenicolor)**

3. Hat med kornet belægning (lup!); stok hvid, eventuelt med et rosa strejf; hathudshyfernes endeceller med tydeligt pålejret pigment 4

Hat uden kornet belægning; stok hvid, gullig, brunlig, grålig eller rød; hathudshyfernes endeceller med eller uden pålejret pigment 6

4. Hat overvejende vinrød til brunlilla eller kødrød (), afbløgende til træbrun (). Hat 30-70 mm bred; lugt ubetydelig; sporefældning hvid; sporer 7-8,5 x 5,5-7 µm, med op til 1 µm høje isolerede pigge; med bøg, eg eller avnbøg; meget sjælden eller overset og kun øst for israndslinjen **lilla skørhat (Russula lilacea)**

Hat dybt rød til rosa eller hvidlig til creme, ofte med rosa anstrøg udefter eller med svagt olivengulligt skær () 5

5. Hat dybt rød til rosa (); sporer 6-8,5 x 6-7 µm, med op til 1 µm høje, isolerede pigge. Hat 20-50 mm bred, kornet omkring midten; stok hvid, ofte med rosa strejf i den nedre del; lugt ubetydelig; sporefældning hvid; med bøg; sjælden eller overset og kun mod øst **giftrod skørhat (Russula emeticicolor)**

Hat hvidlig til creme, ofte med rosa anstrøg udefter eller med svagt olivengulligt skær (); sporer 7-9 x 6,5-7 µm, med op til 0,6 µm høje, lidt forbundne vorter. Hat 20-50 mm; stok hvid; sporefældning hvid; med bøg i parker og skove; ret sjælden og østlig **kornet skørhat (Russula roseoaurantia)**

6. Hat hvidlig, creme, lædergul, karrygul eller gul () 7

Hat med orange, røde, rødviolette, brunrøde eller brunrosa nuancer () 10

7. Kød med eftersmag af blyantstræ (cedertræ); hat creme til hvidlig se fastkødet skørhat (*Russula lepida*), pkt. 10

Kød uden eftersmag af blyantstræ; hat mere gul 8

8. Kød meget fast; stok med alderen ofte med violette strejf (), ikke grånende se ferskengul skørhat (*Russula violeipes*), pkt. 2

Kød ikke så fast; stok hvid, eventuelt grånende med alderen 9

9. Stok vedblivende hvid; hat hvidlig til creme; sporer med isolerede eller lidt forbundne, op til 0,7 mm høje vorter se *Russula galochroa*, D20

Stok grånende med alderen; hat mest lædergul til karrygul; sporer med op til 1,3 mm høje pigge, som er helt eller delvist netforbundne. Hat 50-120 mm bred; stokbasis rød med KOH; lugt ubetydelig; sporefældning hvid; sporer 8-10 x 7-8 µm, med op til 1,3 µm høje, ret forbundne pigge; i løv- og nåleskov; meget almindelig **okkergul skørhat (Russula ochroleuca)**

- 
10. Kød med eftersmag af blyantstræ (cedertræ); stokkød påfaldende hårdt; hathud mat, ikke aftrækkelig; stok oftest med blodrøde strejf (), sjældnere rent hvid. Hat 50-140 mm bred; lugt ubetydelig; sporefældning creme; sporer 8-9 x 7-8 µm, med netagtigt forbundne vorter; med bøg på morbund; almindelig, men næsten fraværende vest for israndslinjen **fastkødet skørhat (Russula lepida)**

Kød uden eftersmag af blyantstræ; stokkød i reglen ret blødt; hathud aftrækkelig eller ikke aftrækkelig; stok hvid, gullig, grånende eller med mere blåligrøde strejf () 11
11. Kød, stok og lameller gulnende til brunende (); hat broget, overvejende lædergul, brunrosa til brunviolet (). Hat 30-60 mm bred; lugt ubetydelig; sporefældning creme; sporer 7-9 x 5,5-7 µm, med noget forbundne vorter; mest i moser med løv- eller nåletræer, men også med bøg på morbund; hist og her, sjældnere mod vest **gulstokket skørhat (Russula puellaris)**³

Ikke gulnende til brunende i alle dele og/eller hat med klarere røde farver 12
12. Med nåletræer 13

Med løvtræer 15
13. Stok ikke grånende, ofte med røde strejf se prægtig skørhat (*Russula paludosa*), H10

Stok grånende 14
14. Hat orange til abrikosgul () se afbløgende skørhat (*Russula decolorans*), H4

Hat med ± vinrøde () farver se vinrød skørhat (*Russula vinosa*), H4
15. Med påfaldende bredt kamfuret hatrand; i tørvemos (*Sphagnum*) eller på tørvejord med birk 16

Hatrand næppe bredt kamfuret; voksested anderledes 18
16. Sporer med til 1 µm høje, noget forbundne vorter. Hat 40-80 mm bred; stok 40-70 x 7-12 mm, cylindrisk, hvid til lyst grå eller lidt rosa; lugt frugtagtig; sporefældning creme; sporer 8-9,5 x 6,5-8 µm; med birk; meget sjælden eller overset **tørvemos-skørhat (Russula robertii)**


Sporer med op til 1,5 µm høje, stort set isolerede pigge 17
17. Sporefældning cremegul (); helt mild; lameller mod hatranden ofte med rød æg; guajak-reaktion hurtigt og dybt grønblå () se året skørhat (*Russula nitida*), H21

Sporefældning creme (); lidt skarp; lameller næppe med rød æg; guajak-reaktion svag se slank skørhat (*Russula gracillima*), F30
18. Stok tydeligt brunende nedefra; frugtlegerer ret kraftige 19

Stok ikke med alderen brunende nedefra; frugtlegerer kraftige eller spinkle 20
19. Stokbasis ved udtørring med tydelig honninglugt; stok uden farve med KOH; smag helt mild; sporer 8,5-11 x 8-9,5 µm, næsten-kugleformede, med et lavt net og superlave, næsten usynlige vorter. Hat 50-100 mm bred; sporefældning creme; i bøgeskove; sjælden og østlig **honning-skørhat (Russula mellolens)**

Uden honninglugt fra stokbasis; stokbasis rød med KOH; smag ofte først moderat skarp, derefter hurtigt mild; sporer 8-11 x 6,5-9,5 µm, bredt ellipsoidiske, med lave vorter, der er forbundet i et fint net. Hat 50-120 mm bred; sporefældning creme; i løvskov, især med bøg; ret sjælden og østlig **knippe-skørhat (Russula viscida)**

3. Den nybeskrevne *Russula purpureopallescens* har 7,5-10 x 6-7,5 µm store, ellipsoide sporer (Q 1,15-1,39), en svagt frugtagtig lugt og vokser med poppel.



20. Hathuden når i reglen ikke helt ud til randen se spiselig skørhat (*Russula vesca*), D11
Hathuden når helt ud til hatranden 21

21. Hat purpurbrun, purpurrød til violetterød, mod midten næsten sort (☹️), ofte med lyse, næsten cremefarvede pletter; med eg, sjældent bøg se purpurbroget skørhat (*Russula undulata*), F29
Hat rød, rosa, brunrød eller orangerød (☹️), eventuelt iblandet grønlig nuancer; i løvskov, især med bøg og birk 22

22. Lameller påfaldende lave og tætte; hathud med vanddrukken radiær struktur; stok ofte med røde strejf, grånende med alderen; smag i lamellerne en anelse skarp se falmende skørhat (*Russula depallens*), I17
Lameller normalt dybe og mere fjerne; hathud næppe med radiær struktur; stok anderledes; smag helt mild 23

23. Hat 20-40 mm bred 24
Hat 40-100 mm bred 25

24. Sporefældning hvid (☼); kød uforanderligt i gnav; lugt ved plukning eller efter opbevaring i æske metallisk som bruskbold (*Scleroderma*). Hat 15-40 mm bred; sporer 6,5-7,5 (-8) x 5,5-6,5 µm, med isolerede eller lidt forbundne vorter; i løvskov, især eller udelukkende med bøg; meget sjælden og østlig **liden skørhat (*Russula minutula*)**
Sporefældning creme (☼); kød let gulnende i sneglegnav og såringsflader; lugt ubetydelig. Hat 20-50 mm bred; sporer 6,5-8 x 5-7 µm, med lave, ret forbundne vorter; i løvskov; især med bøg; ret sjælden og østlig **gulnende skørhat (*Russula puellula*)**

25. Sporefældning cremegul (☼); hat abrikosorange til koralrød (☹️), ofte lysest og mest orange i midten; sporer piggede med op til 0,8 µm høje, stort set isolerede pigge se orangerød skørhat (*Russula velenovskyi*), H25
Sporefældning hvid til creme (☼); hat cinnoberrød, koralrød, grårosa til rosabrun (☹️); sporer med lave, ± forbundne vorter 26

26. Stok hvid (☹️); stoktop oftest bæltet-fnugget (lup!), påfaldende udvidet mod hatten. Lameller hurtigt creme; sporefældning hvid til lyst creme; sporer 6-8 x 5-6,5 µm, med ret forbundne vorter; lugt svagt frugtagtig; i løvskov, især med bøg; hist og her, dog næsten fraværende vest for israndslinjen **rosa skørhat (*Russula velutipes*)**
Stok stedvist ± rosa (☹️); stoktop aldrig bæltet-fnugget. Sporefældning hvid; sporer 6,5-8 x 6-7 µm, med isolerede eller lidt forbundne vorter; lugt fraværende; smag mild; i varme løvskove (især med eg?); DK? **Russula zvarae**



Nøgle F – giftskorhatte

Smag skarp; sporefældning hvid til creme.



1. Hat creme, cremegul, gul, svovlgul, lædergul eller okkerbrun (☹️) 2
Hat med røde, violette eller grønlig farver (☹️) 7

2. Smag højest middelskarp; stok grånende med alderen se okkergul skørhat (*Russula ochroleuca*), E9
Smag meget skarp; stok næppe grånenden 3

3. Hat urent cremegul, lædergul til okkerbrun (☹️). Hat 30-80 mm bred; stok tonet i hattens farve; lugt karakteristisk, ± frugtagtig; sporefældning hvid; sporer 7,5-9 x 6-7 µm, med forbundne vorter; med bøg; almindelig **galde-skørhat (*Russula fellea*)**
Hat creme, bleggul til skinnende gul (☹️) 4

4. Lameller rosa til røde (☹️) med ammoniak eller KOH *Russula sardonina* var. *citrina*, se hovedvarieteten, I10
Lameller ikke rosa til røde med ammoniak eller KOH 5

5. Hat rent skinnende gul (☹️); sporefældning dybt cremegul (☼) se sol-skørhat (*Russula solaris*), I3
Hat creme til svovlgul (☹️); sporefældning hvid (☼) 6

6. Lamelæg ofte fint savtakket; hatcystider flercellede *Russula fragilis* var. *gilva*; se hovedvarieteten, F20
Lamelæg jævn; hatcystider encellede. Hat 20-70 mm bred; lugt ± frugtagtig (som galde-skørhat); sporer 7-8,5 x 5,5-7 µm, med ret forbundne vorter; med bøg; sjælden **bleggul skørhat (*Russula raoultii*)**

7. I klitter og moser med pil. Hat 15-40 mm bred; lugt ubetydelig; sporefældning hvid; sporer 6,5-9 x 6-7,5 µm, med forbundne vorter; hist og her **klit-skørhat (*Russula laccata*)**
I skove, haver mm. og med andre træer 8

8. Hat rød, sart rosa eller hvidlig med rosa anstrøg (☹️), aldrig grønligt afblegende 9
Hat med urent røde, vinrøde, grårosa, violette eller brunrøde farver (☹️), eventuelt grønligt (☹️) afblegende 18

9. Sporefældning ± creme (☼) 10
Sporefældning hvidlig (☼) 12

10. I nåleskov; stok oftest med røde farver, men eventuelt også grånende se I6
Med løvtræer; stok hvid, grånende eller lidt brun ved basis 11

11. Med birk; hat ofte stærkt afblegende; stok grånende med alderen se falmende skørhat (*Russula depallens*), I17
Med andre løvtræer; hat ikke stærkt afblegende; stok ikke grånende med alderen. Hat 40-120 mm bred, mat; stok hvid eller med rosa anstrøg, ofte lidt brunanløben ved basis; lugt svagt frugtagtig; sporer 6,5-8,5 x 5,5-7 µm, med noget forbundne vorter; sjælden og ikke kendt vest for israndslinjen **cremesporet gift-skørhat (*Russula persicina*)**

12. Lameller langsomt men tydeligt gulplettede ved såring, ret fjerne; med løvtræer, især eg på fed bund. Hat 30-70 mm bred; stok hvid, eventuelt med røde strejf; lugt svagt frugtagtig; sporer 7-9 x 6-7,5 µm, overvejende med isolerede vorter; sjælden og østlig **gulpletet gift-skørhat (*Russula luteotacta*)**
Lameller ikke gulplettede, middeltætte; voksested ofte anderledes 13



4. *Russula abscondita* ligner, men har mindre sporer (7,2-9,3 x 5,9-7,7 µm), lugter af pelargonium og vokser med eg. DK?



13. Med birk, ofte enlige birke i nåleskov eller i moser; hat sart rød, afblegende til hvid (☐); stok 5-10 mm tyk. Hat 20-50 mm bred; lugt svagt frugtagtig; sporer 8,5-11,5 x 7,5-8,5 µm, med netagtigt forbundne pigge; almindelig **bleg gift-skørhat (Russula betularum)**
Ofte med andre træer; hat oftest med kraftigere farver (☐); stok oftest tykkere 14



14. Med nåletræer på mager bund 15
Med løvtræer 16

15. Stok vedblivende hvid. Hat 30-100 mm bred; lugt frugt- eller kokosagtig; sporer 8-11 x 7,5-8,5 µm, med op til 1 µm høje, forbundne vorter; guajak-reaktion langsomt moderat grønblå; i nåleskov, især på mager bund; almindelig **stor gift-skørhat (Russula emetica)**
Stok tydeligt grånende med alderen. Hat 30-80 mm bred; lugt ubetydelig; sporer 7-9,5 x 6-8 µm, med op til 0,7 µm høje, forbundne vorter; guajak-reaktion langsomt moderat grønblå; i granskov, især på mager bund; DK? **gråstokket gift-skørhat (Russula hydrophila)**




16. Frugtlegerne grånende til sortnende med alderen. Hat op til 60 mm bred; lugt frugtagtig; guajak-reaktion på stokken negativ; sporer (6-) 7-9 (-9,5) x (5-) 6-7,5 (-8) µm, med lave, forbundne vorter; i parker med eg og avnbøg på god bund; ej DK **Russula rhodomelanea**
Ikke grånende til sortnende 17



17. Lameller ofte med et svagt grønblåt skær (■); sporer 6,5-8,5 x 5,5-7 µm, med op til 0,5 µm høje, noget forbundne vorter; guajak-reaktion hurtigt grønblå (■). Hat 30-60 mm bred; lugt svagt frugtagtig; sporefældning hvid; med bøg (udelukkende?); ret almindelig **lille gift-skørhat (Russula mairei)**
Lameller ± hvide; sporer 7-10 x 6-8 µm, med op til 1 µm høje, forbundne vorter; guajak-reaktion langsomt moderat grønblå (■). Hat 30-100 mm bred; lugt frugtagtig; sporefældning hvid; med løvtræer, helt overvejende med bøg, måske især på mager bund; ret almindelig **mellemstor gift-skørhat (Russula silvestris)**



18. Stok tydeligt brunt anløbende nedefra og rød med KOH, 15-50 mm tyk se knippe-skørhat (*Russula viscida*), E19
Stok ikke tydeligt brunt anløbende nedefra, dog eventuelt grånende eller gulnende; ikke rød med KOH; stok ofte slankere 19



19. Lameller savtaktede (lup!) 20
Lameller ikke savtaktede 21



20. Smag lidt skarp; lugt svag, som peberrod; i fugtig, sur nåleskov, typisk i tørvemos (*Sphagnum*) se vand-skørhat (*Russula aquosa*), pkt. 25
Smag udpræget skarp; lugt frugt- til kokosagtig; med eg. Hat 20-70 mm bred; sporefældning hvid; sporer 7,5-9 x 6-7,5 µm, med netornament og lave, op til 0,5 µm høje vorter; almindelig **savbladet skørhat (Russula fragilis)**



21. Med nåletræer 22
Med løvtræer 26



22. Stok med dominerende røde eller rødviolette farver (■) 23
Stok hvid, gullig eller med et ganske svagt rødt strejf 24



23. Kød ret skørt; med gran; sporefældning creme (●); sporer med op til 1,2 µm lange, isolerede pigge. Hat 30-100 mm bred; lugt som stikelsbærkompot; sporer 7,5-9 x 6,5-7,5 µm; almindelig, sjældnere mod vest **Queléts skørhat (Russula queletii)**⁵
Kød ret fast; især med fyr; sporefældning lyst cremegul (●) eller mørkere; sporer med forbundne vorter se I10



24. Stok noget gulnende; stok kamret og skrøbelig; med ædelgran. Sporer 7-9,5 x 6,5-8 µm, med op til 1,2 µm høje, noget forbundne pigge; ej DK (sydlig) **Russula cavipes**
Stok ikke gulnende; stok ± massiv; oftest med andre nåletræer 25



25. Smag meget skarp; lugt kokosagtig (amylacetat); hat enten med ret lyserøde og grønlig, pastelagtige farver (☐) eller mere rent rød (☐), ofte med mørkere, med tiden næsten sortagtig midte (☐); stok ikke grånende. Hat 40-80 mm bred; sporefældning hvid til lyst creme; sporer 6-8 x 5-6,5 µm, med netagtigt forbundne vorter; med gran og fyr (og ædelgran?); hist og her, meget sjælden mod syd-øst **sortrød skørhat (Russula atrorubens)**
Smag lidt skarp; lugt svag, som peberrod; hat grårød (☐), med lidt mørkere midte; stok ± grånende. Hat 30-70 mm bred; sporefældning hvid; sporer 6-8 x 5,5-7 µm, med op til 0,8 µm høje, netagtigt forbundne vorter; i fugtig, sur nåleskov, typisk i tørvemos (*Sphagnum*); meget sjælden **vand-skørhat (Russula aquosa)**



26. Med med tydelig lugt af pelargonie 27
Ikke med lugt af pelargonie 28



27. Med poppel. Hat 30-80 mm; sporefældning creme; sporer 7-9 x 6-7,5 µm, med op til 1 µm høje, noget forbundne pigge; ret sjælden eller overset **pelargonie-skørhat (Russula pelargonica)**⁶
Med eg og andre løvtræer, men aldrig med poppel. Hat 40-70 mm mred, mørke grårosa, ofte også med grønlig nuancer; sporer 7,5-10 x 6-8,5 µm med et op til 0,8 µm højt ornament af noget forbundne vorter; DK? **Russula multiseptata**



28. Med el; stok med alderen stærkt gulnende og grånende. Hat 20-50 mm bred; lugt svagt frugtagtig; sporefældning hvidlig; sporer 8,5-10,5 x 7-8 µm, med lave, netagtigt forbundne vorter; ret sjælden og stort set fraværende vest for israndslinjen **elle-skørhat (Russula alnetorum)**
Med birk eller eg; stok ikke stærkt grånende 29



29. Med eg; sporefældning hvidlig (●); hat purpurbrun, purpurrod til violetrød, mod midten næsten sort (☐), ofte nedblegende med cremegule pletter; stok hvid og grånende. Hat 60-120 mm bred; sporer 6,5-9 x 5,5-7 µm, med lave forbundne vorter; almindelig **purpurbroget skørhat (Russula undulata)**
Med birk; sporefældning creme (●); hat med udpræget pastelagtige vinrøde, brunviolet, brunrosa og grønlig farver (☐); stok hvid, men ofte med røde strejf 30



30. På ret tør bund; stok med alderen med lædergule pletter; sporer med forbundne vorter se foranderlig skørhat (*Russula versicolor*), I20
På fugtig bund; stok ikke med brune pletter, men eventuelt svagt vandddrukket læderbrun med alderen; sporer med isolerede pigge. Hat 20-60 mm bred; lugt svagt frugtagtig; smag først moderat skarp, men hurtigt næsten mild; sporefældning creme; sporer 7-8,5 x 5,5-6,5 µm; hist og her, dog fraværende eller sjælden vest for israndslinjen **slank skørhat (Russula gracillima)**

5. Særligt mørkfarvede eksemplarer går under tidenunder navnet *Russula fuscobroides*.

6. Det er uklart hvordan arten skal afgrænses. I Danmark ser vi tilsyneladende ret små frugtleger med bævreasp på mager bund og anderledes kraftige med andre popler. Navnene *Russula violacea* og *Russula clariana* er også i spil.

Nøgle G – hummerskørhatte

Smag mild; lugt som kogt skaldyr; stok bruner nedefra; sporefældning creme til cremegul; FeSO₄-reaktion grøn.

- 

1. Hat ret ensfarvet olivengrøn, olivenbrun, læderbrun eller gulbrun (☐) 2
Hat i hvert fald stedvis med ± røde farver 3

2. Med birk, poppel, fyr og gran. Hat 40-90 mm bred; sporer 7,5-8,5 x 6-7 µm, med op til 1 µm lange, stort set isolerede pigge; sporefældning cremegul; på ret tør bund; hist og her **olivengrøn skørhat (Russula clavipes)**
Med pil se pile-skørhat (*Russula subrubens*), pkt. 7

3. Med nåletræer 4
Med løvtræer 5

4. Stok ± karminrød (☐); sporer 8-9,5 x 6,5-7,5 µm. Hat 60-120 mm bred, ret ensfarvet karminrød med mørkt vinrød midte; sporefældning cremegul; sporer med op til 1 µm lange, næsten isolerede pigge; især med fyr, gran og ædelgran; ret almindelig, sjældent mod syd. **hummer-skørhat (Russula xerampelina)**
Stok hvidlig (☐), senere brunt anløbende; sporer 8,5-11,5 x 7,5-8,5 µm. Hat 25-90 mm bred, blakket brunlig, brunrød, karminrød til oliven; sporer med op til 1,1 µm lange, næsten isolerede pigge; sporefældning cremegul; med nåletræer; ej DK **Russula serissima**

5. Stok med en ± karminrød (☐) side; med birk. Hat 40-65 mm bred; stok 10-15 mm tyk; sporer 8-9 x 6,5-7,5 µm med op til 0,6 µm høje, isolerede pigge; sporefældning cremegul; med birk; meget sjælden **Russula lapponica**
Stok ikke med store røde områder; med diverse løvtræer 6

6. Med pil 7
Med birk, poppel, eg eller bøg 8

7. Hathud i hatmidten med opsvulmede endeceller se *Russula nuoljae*, pkt. 9
Hathud i hatmidten ikke med opsvulmede endeceller. Hat 30-80 mm bred; stok hvid, men ofte med mindre røde strejf; sporer 8-10 x 6-7,5 µm, med op til 1 µm lange, noget forbundne pigge; sporefældning cremegul; hist og her, især med krybende pil langs kysterne **pile-skørhat (Russula subrubens)**

8. Med birk eller poppel, gerne i naturlige habitater 9
Med bøg eller eg, gerne i parker 10

9. Hatcystider over 6 µm brede; med birk og poppel
se olivengrøn skørhat (*Russula clavipes*), pkt. 1
Haticystider under 6 µm brede; med birk og pil. Hat 40-100 mm bred, brunrød til dæmpet karminrød flammet eller afbleget i mere brunlige områder; stok hvid; sporefældning cremegul; sporer 8-9,5 x 6,5-7,5 µm, med op til 0,8 µm høje, noget forbundne vorter; ej DK **Russula nuoljae**

10. Sporer 8,5-11 x 7,5-8,5 µm, med 1-1,5 µm høje, isolerede pigge; hyfer i hatmidten hathud med flaskeformet opsvulmede endeceller; hat ret regelmæssig, med vinrøde eller olivengrønne farver (ligner stor skørhat). Hat 60-140 mm bred; stok hvid; sporefældning ± cremegul; i skove og parker, overvejende med bøg, sjældent med eg eller avnbøg; hist og her, men fraværende vest for israndslinjen **bøge-skørhat Russula faginea**
Sporer 7,5-10 x 6-8 µm, med op til 0,7 µm høje, isolerede eller lidt forbundne vorter; hyfer i hatmidten hathud næppe med flaskeformet opsvulmede endeceller; hat ofte uregelmæssig, broget og ofte med store brunlige områder. Hat 40-100 mm bred; stok hvid eller sjældent med rosa anstrøg; sporefældning cremegul; med eg, især i parker med ældre træer; ret sjælden og fraværende vest for israndslinjen **bugtet skørhat (Russula graveolens)**
-
- Nøgle H – abrikosskørhatte
- Smag mild; sporefældning cremegul til orangegul.
- 

1. Lugt tydeligt fiskeagtig; stok med vinrøde (☐) områder
se skønfootet skørhat (*Russula amoenicolor*), E2
Lugt anderledes eller ubetydelig; stok ikke med vinrøde farver 2

2. I nåleskov 3
I løvskov 14

3. Kød, stok og lameller grånende med alderen og ved sårang 4
Kød, stok og lameller ikke grånende 5

4. Hat orange til abrikosgul (☐). Hat 50-120 mm bred; lugt ubetydelig; sporefældning creme til cremegul; sporer 9-14 x 8-11 µm, med op til 1,5 µm lange, isolerede pigge; i sandede fyrreplantager; hist og her i Nord- og Vestjylland og Nordsjælland, stort set fraværende i resten af landet **afblegende skørhat (Russula decolorans)**
Hat ± vinrød (☐). Hat 40-120 mm bred; lugt ubetydelig; sporefældning cremegul; sporer 9-11 x 7-9 µm, med op til 1 µm lange, isolerede pigge; i sandede fyrreplantager; hist og her, men sjældent mod syd **vinrød skørhat (Russula vinosa)**

5. Hat først kegle- til klokkeformet, siden udbredt med fremtrædende pukkel. Hat 40-100 mm bred, mørkt lillabrun, omkring midten næsten sort; lugt frugtagtig; smag mild eller en smule skarp hos unge eksemplarer; sporefældning orangegul; sporer 8-9 x 6,5-8 µm, med forbundne vorter; med fyr; sjældent og stort set fraværende i sydlige landsdele **puklet skørhat (Russula caerulea)**
Hat først halvkugleformet til hvælvet, siden afladet eller nedtrykt, uden tydelig pukkel 6

6. Stokbasis med svag til tydelig jodagtig lugt 7
Uden jodagtig lugt 10

7. Hat koralrød til cinnoberrød (☐), eventuelt med mere ferskenfarvet midte. Hat 40-85 mm bred; smag mild; sporefældning ± cremegul; sporer 7-9,5 x 6-8 µm, med op til 1 µm høje, noget forbundne vorter; på sandbund med fyr **Russula roseipes**
Hat ± grønlig, ± violet til strågul (☐) 8

8. Hat ± grønlig (☐), eventuelt iblandet violette og brune (☐) nuancer; sporer 8-10,5 x 7-9 µm. Hat 40-70 mm bred; sporefældning orangegul; sporer med isolerede pigge; med nåletræer; ej DK **Russula postiana**
Hat ± mørkviolet til gråviolet, sjældnere ± strågul, men uden klare grønne farver (☐); sporer 7,5-9 x 6,5-7,5 µm 9

9. Sporer vortede med veludviklet netmønster, hvor stort set alle vorter er forbundne. Hat 30-100 mm bred; sporefældning cremegul til orangegul; sporer 7,5-9 x 6,5-7,5 µm; især med fyr; sjældent og mest mod øst **jod-skørhat (Russula turci)**
Sporer vortede med ± isolerede eller delvist forbundne vorter. I øvrige karakterer som ovenstående og muligvis identisk med denne; DK? **ametyst-skørhat (Russula amethystina)**

10. Hat brunorange til teglrød eller orangerød, sjældent afbleget og helt lys (☐) ; stok tyk (15-35 mm) og lang, typisk væsentlig længere end hatbredden, hvid, men oftest med røde strejf; sporefældning cremegul (☐). Hat 50-180 mm bred; smag en anelse skarp; lugt ubetydelig; sporer 8-11 x 7-9 µm, med ret forbundne pigge; i ± næringsfattig nåleskov; meget almindelig i nordlige og vestlige landsdele, men sjældent mod sydøst **prægtig skørhat (Russula paludosa)**
Hatfarver typisk mere vinrøde, brunrøde, oliven eller brunlige (☐) farver; stok mindre eller kortere, hvid; sporefældning orangegul (☐) 11

11. Hat ret ensfarvet grøngul til olivenbrun (☞ ); basidier 2-sporede. Hat 40-80 mm bred; lugt ubetydelig; sporer 10-12 x 8,5-10 µm, med op til 2 µm lange, helt isolerede pigge; sporefældning orangegul; med rødgran; meget sjælden *Russula olivina*
Hat med vinrøde farver (☞ ), eventuelt iblandet mere grønne eller gulgrønne strejf; basidier 4-sporede 12
12. På kalkrig eller leret bund; stok 10-30 mm tyk, fastkødet; sporer 8-11 x 7-9 µm, med op til 1,7 µm høje, stort set isolerede vorter eller pigge. Hat 50-150 mm bred; lameller ofte påfaldende tværråede; lugt ubetydelig eller lidt frugtagtig; sporefældning orangegul; med nåletræer i parker og skove; ret sjælden og ikke kendt vest for israndslinjen *mandel-skørhat (Russula integra)*
I næringsfattig, ofte sur nåleskov; stok 5-15 mm tyk, ofte blødkødet; sporer med op til 1 µm høje vorter eller pigge, som eventuelt kan være delvist forbundet af linjer 13
13. Med gran. Hat 20-60 mm bred; meget blødkødet; lugt svagt frugtagtig; sporefældning orangegul; sporer 7-10 x 6-8 µm, med op til 1,2 µm lange, stort set isolerede pigge; almindelig, dog sjælden i Vestjylland *spinkel skørhat (Russula nauseosa)*
Med fyr, muligvis også lærk. Hat 30-90 mm bred; lugt ubetydelig; sporefældning orangegul; sporer 7,5-9 x 6,5-7,5 µm, med op til 0,8 µm høje, ret forbundne vorter; ret almindelig, men sjældnere mod vest *fyrre-skørhat (Russula cessans)*
14. Kød og stok først udpræget rødmende, siden stærkt grånende; hat først karminrød, siden gråligt vinrød til rødgrå (☞ ); med eg på varme steder på fed bund. Hat 50-100 mm bred; lugt fiskeagtig; sporefældning orangegul; sporer 8-10 x 6,5-8 µm, med noget forbundne pigge; meget sjælden og sydlig (Lolland) *rødmende skørhat (Russula seperiina)*
Kød ikke rødmende; hat ikke med alderen grånende mod rødgrå; økologi eventuelt anderledes 15
15. Med birk 16
Med andre løvtræer 26
16. Hat overvejende med grøngrå til grønne (☞  farver se *Russula medullata*, pkt. 50
Hat ikke overvejende grønlig 17
17. Stok med lædergule pletter med alderen; på ± tør bund med birk, ofte i plæner; smag en anelse skarp; sporer ofte påfaldende aflange, med noget forbundne vorter se foranderlig skørhat (*Russula versicolor*), I20
Stok ikke lædergul med alderen; økologi eventuelt anderledes; sporer eventuelt anderledes 18
18. Hat ret klart gul (☞ ); 19
Hat med ± rødlig, vinrøde, rosa, kødrøde, orange, lædergule eller olivengrønne (☞  farver 20
19. Kød, stok og lameller stærkt grånende; hat 40-120 mm bred; i birkemo-ser; lugt ubetydelig. Sporefældning cremegul; sporer 8-9,5 x 6,5-7,5 µm, med noget forbundne vorter; almindelig i de fleste landsdele *birke-skørhat (Russula claroflava)*
Ikke grånende; hat 20-50 mm bred; med birk på tørrere bund; lugt typisk syrlig ved indtørring. Sporefældning orangegul; sporer 7,5-9 x 6-7,5 µm, med stort set isolerede pigge; med birk; DK? (sydlig art) *Russula acetolens*
20. Frugtlegerer ret spinkle og blødkødede; hat med karminrøde, vinrøde, grårøde eller lidt grønlig (☞  farver 21
Frugtlegerer mere kraftige og robuste; hat cinnoberrød, rosa, brun-oran-ge, lædergul, laksefarvet eller ferskenfarvet (☞  22



21. Sporer 7-10 x 6,5-8,5 µm, med til 1,5 µm høje, isolerede pigge; sporefældning cremegul (☞ ); stok hvid, men ofte med blåligrøde strejf (☞ ); guajak-reaktion hurtigt og dybt grønblå (☞ ). Hat 20-60 mm bred; lugt sødligt frugtagtig; sporefældning cremegul; med birk, oftest fugtig, men også i plæner; ret almindelig *året skørhat (Russula nitida)*
Sporer 8-9,5 x 6,5-8 µm, med op til 1 µm høje, noget forbundne vorter; sporefældning dybt creme (☞ ); stok hvid; guajak-reaktion langsom og ret svag (☞ ) se tørvemos-skørhat (*Russula robertii*), E16
22. Lameller en anelse skarptsmagende; stok grånende med alderen; frugtlegerer ofte påfaldende lave og brede; hat mat og ofte vand-drukken i radierende flammer se falmende skørhat (*Russula depallens*), I17
Lameller helt milde; stok ikke grånende; frugtlegerer ikke påfaldende lave; hat ofte skinnende 23
23. Sporer med vorter med mange forbindelseslinjer; lugt frugtagtig; sporefældning orangegul (☞ ). Hat 50-70 mm bred, med meget variable træbrune, kødrøde, ferskenfarvede eller grønlig nuancer; sporer 7-9,5 x 6-8 µm; med birk; DK? *Russula fulvograminea*
Sporer med stort set isolerede pigge; lugt ikke påfaldende; sporefældning cremegul til orangegul (☞  24
24. Hat blegt abrikosgul, lædergul, laksefarvet til ferskenfarvet (☞ ). Hat 40-80 mm bred; lugt ikke påfaldende; sporefældning orangegul; sporer 7-8,5 x 6-7 µm, med isolerede pigge; med birk; meget sjælden eller overset *cremerosa skørhat (Russula cremeovallanea)*
Hat med klarere farver (☞  25
25. Sporefældning lyst cremegul (☞ ); sporer med stort set isolerede pigge; hat abrikosorange til koralrød (☞  med lysere, mere brun-oran-ge midte; stok hvid eller med svage, røde strejf. Hat 30-80 mm bred; hatfarven løber ofte ned ad lamelæggen; lugt ikke påfaldende; sporer 6,5-9 x 6-7 µm; mest med birk, men også med bøg; ret almindelig *orangerød skørhat (Russula velenovskyi)*
Sporefældning dybt cremegul til orangegul (☞ ); sporer med en del forbundne vorter; hat oftest domineret af orange til rosa farver, eventuelt med mørkere midte (☞ ); stok med røde strejf nedefter. Hat 30-70 mm bred; lugt ikke påfaldende; sporer 8-9 x 6,5-7,5 µm; med birk i parker; meget sjælden *koralrød skørhat (Russula font-queri)*
26. Hat mørkt og ensfarvet brunviolet (☞ ); se brunviolet skørhat (*Russula brunneoviolacea*), D16
Hat anderledes farvet, eventuelt broget 27
27. Stok og eventuelt lamelrand med smukt orangegule strejf eller brungult anløbende 28
Stok uden gule eller gyldne farver og ikke brungult anløbende 30
28. Stok og lamelrand med gule (☞  strejf (mere lysende gul end sporefar-ven). Hat 50-100 mm bred; lugt ubetydelig; sporefældning cremegul til orangegul; sporer 7-10 x 6-8 µm, med op til 1 µm høje, noget forbundne pigge; med bøg på leret eller kalkrig bund; sjælden og østlig *gylden skørhat (Russula aurea)*
Uden orangegule farver, men alle dele brungult anløbende med alde-ren 29
29. Lameller helt milde; sporefældning dybt creme (☞ ); se gulstokket skørhat (*Russula puellaris*), E11
Lameller noget skarptsmagende; sporefældning cremegul (☞  se *Russula versatilis*, I xx



- 



48. Hat overvejende med grøngrå til grønne (☹     ) farver .. 49
 Hat overvejende rosabrun, brunrød eller purpurbrun (☹     ), eventuelt også med mindre grønne områder 51



49. Sporefældning orangegul (☼) se Romells skørhat (*Russula romellii*), pkt. 52
Sporefældning cremegul (☼) 50

50. Sporer 7-8,5 x 6-7 µm, med isolerede pigge. Hat 40-100 mm bred; lugt ubetydelig; primært arktisk-alpin art med poppel, birk, pil, pileurt og rypelyng (*Dryas*); DK? *Russula medullata*
Sporer med ± forbundne pigge se grågrøn skørhat (*Russula pseudoaeruginea*), D27

51. Hat mat (som hos stor skørhat), med blegt abrikosgul til lædergul (☼) midte og brunligt koralrød til brunrosa (☼) rand; ofte fint sprækkende ved randen; stok oftest kortere end hatbredden. Hat 50-150 mm bred; lugt ubetydelig; sporefældning cremegul til orangegul; sporer 7-9,5 x 6-7,5 µm, med noget forbundne pigge; hathudshyfernes endeceller uden pålejret pigment; med hatcystider; med bøg; hist og her, østlig **kortstokket skørhat (*Russula curtipes*)**
Hat ± skinnende (eller i hvert fald ikke udpræget mat), med mere vinrøde eller mørkere brunrøde (☼) farver, ikke sprækkende ved randen; stok oftest længere end hatbredden 52

52. Hat 60-160 mm, klæbrig, udpræget skinnende, overvejende purpurbrunrød (☼) , men næsten altid flammeret og med uregelmæssige, lædergule (☼) eller oliven-grønne partier eller pletter, sjældent helt lysegrøn (☼) ; sporer med ret forbundne pigge; hathudshyfernes endeceller uden pålejret pigment. Sporer 6,5-9 x 5,5-7 µm; lugt ± frugtagtig; sporefældning orangegul; med bøg; ret almindelig, men næsten fraværende vest for israndslinjen **Romells skørhat (*Russula romellii*)**

- Hat 50-100 mm, snart tør, normalt ikke flammeret og normalt uden afblegede pletter; sporer med isolerede pigge; hathudshyfernes endeceller med pålejret pigment 53

53. Med hathudscystider, der farves gråsorte i sulfovanilin. Hat 30-100 mm bred; lugt fraværende, eventuelt honningagtig ved indtørring; sporefældning orangegul; sporer 8,5-10 x 7-9 µm, med op til 1,4 mm lange pigge; med eg og lind (og bøg?) på leret, varm bund; meget sjælden, sydlig og østlig **mahogni brun skørhat (*Russula melitodes*)**
Uden hathudscystider, der farves gråsorte i sulfovanilin se brunrød skørhat (*Russula sericatulata*), pkt. 36

Nøgle I – chiliskørhatte
Smag skarp; sporefældning cremegul til orangegul.

1. Hat lædergul til gul (☼) 2
Hat med røde, violette, grønlig eller brunlige (☼) farver 4
2. Med fyr; lameller rosa til røde (☼) med ammoniak eller KOH; sporer med forbundne vorter 3
varietet af citronbladet skørhat (*Russula sardonias* var. *citrina*)
Med bøg; lameller ikke rødlige med ammoniak eller KOH; sporer med isolerede vorter 3
3. Med pil eller poppel; smag moderat skarp se *Russula roseocremea*, pkt. 16
Med bøg; smag omgående meget skarp Hat 20-70 mm bred; lugt pelargonieagtig; sporer 7-8 x 5-7 µm, med isolerede pigge; med bøg, sjældent med eg; ret almindelig, sjældnere mod vest **sol-skørhat (*Russula solaris*)**





4. Med nåletræer 5
Med løvtræer 14
5. Hat blodrød, cinnoberrød til rosa (☼) ; stok med røde områder 6
Hatfarver mørkere eller mere purpur (☼) , eventuelt afblegende brunligt (☼) ; stok med eller uden røde områder 8
6. Hat udpræget skinnende; på fugtig bund med gran. Hat 50-100 mm bred; lugt ubetydelig; sporefældning dybt creme til cremegul; sporer 7,5-9 x 6,5-7,5 µm, med netagtigt forbundne vorter; meget sjælden **lak-skørhat (*Russula rhodopus*)**
Hat mat eller højst lidt skinnende; med gran eller fyr 7
7. I tørvemos (*Sphagnum*) med gran; hathud ± aftrækkelig; stok stærkt grånende; sporer 8,5-10,5 x 7,5-8,5 µm, med netagtigt forbundne vorter. Hat 40-80 mm bred; lugt ubetydelig; sporefældning cremegul; meget sjælden **sump-skørhat (*Russula helodes*)**
Med fyr, sjældent også med ædelgran; hathud ikke aftrækkelig; stok næppe stærkt grånende; sporer 7-8,5 x 6,5-7,5 µm, med ret isolerede vorter. Hat 50-100 mm bred; lugt svagt frugtagtig; sporefældning cremegul; især på kalkpåvirket bund; ret sjælden og mest mod nord, lokalt almindelig **blodrød skørhat (*Russula sanguinea*)**
8. Sporefældning dybt creme til lyst cremegul (☼) ; med svag lugt af stikkelsbærkompot eller frugtagtig 9
Sporefældning dybt cremegul til orangegul (☼) ; lugt fraværende eller blyantsagtig eller frugtagtig 11
9. Kød ret skørt; med gran; sporer med op til 1,2 µm lange, isolerede pigge se Quélets skørhat (*Russula queletii*), F23
Kød ret fast; med fyr eller ædelgran; sporer med forbundne vorter 10
10. Hat ± puklet; lamellers egenfarve gullig; lameller rosa til røde (☼) med ammoniak eller KOH; lugt svagt frugtagtig. Hat 40-100 mm bred; sporer 7-9 x 6-7 µm, med noget forbundne vorter; med fyr og ædelgran; ret almindelig, dog sjælden mod sydøst **citronbladet skørhat (*Russula sardonias*)**
Hat ikke puklet; lamellers egenfarve hvid; lameller ikke rosa med ammoniak eller KOH; med tydelig lugt af æble. Hat 30-70 mm bred; sporer 7-9 x 5,5-7 µm, med forbundne vorter; i fyrreskove på sandbund; meget sjælden **sand-skørhat (*Russula torulosa*)**
11. Smag langsomt noget skarp . . . se fyrre-skørhat (*Russula cessans*), H13
Smag i det mindste efter nogen tid brændende skarp 12
12. Sporefældning dybt cremegul (☼) ; stok ofte med røde strejf; lugt fraværende eller blyantstræagtig; sporer 8-11 x 6,5-8,5 µm, med noget forbundne vorter. Hat 50-120 mm bred; i nåleskov, især med fyr; meget sjælden **peber-skørhat (*Russula badia*)**
Sporefældning orangegul (☼) ; stok næppe med røde strejf; med svagt lugt af pelargonie, stikkelsbærkompot eller frugt; sporer med isolerede pigge 13
13. Hat 70-120 mm bred, mørkt brun, eventuelt med olivenbrune nuancer; sporer 10-12 x 8-10 µm, med op til 2 µm lange, isolerede pigge. Lugt af æblekompot; i nåleskov, især med fyr; DK? *Russula adulterina*
Hat 40-70 mm bred, mørkt brun, men med violette nuancer; sporer 8-10,5 x 7-8,5 µm, med op til 1 µm lange, isolerede pigge. Lugt af pelargonie; med nåletræer; meget sjælden **nåleskarp skørhat (*Russula firmula*)**
14. Med pil, birk og poppel 15
Med eg, lind, avnbøg eller bøg 21





15. Stok 10-30 mm tyk, ret fast, ikke med lædergule pletter, men eventuelt grånende; hat orange til rød (☐☐☐☐☐☐), eventuelt afbleget til grålig, creme eller hvidlig (☐) 16
Stok 5-10 (-15) mm tyk, skør, med alderen eventuelt med lædergule pletter; hat med blandede pastelfarver eller mere ensfarvet vinrød til mørkviolet (☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐) 18
16. Med pil eller poppel. Hat 50-120 mm bred, lædergul, lyst rosa til koralrød, ofte med lidt mørkere midte; stok 10-25 mm tyk, ret kort, hvidlig; sporefældning cremegul; sporer 6,5-9 x 5,5-7 µm, med op til 0,8 µm høje, isolerede vorter; lugt noget frugt- til blomsteragtig; smag langsomt moderat skarp i lamellerne; ofte i vejkanter; formodentlig sjælden **rosaflammet skørhat (Russula roseocremea)**
Med birk 17
17. Smag moderat skarp i lamellerne, ± mild i hatkødet; hat ± grårød (☐☐☐☐☐☐), ofte afblegende mod creme (☐); stok grånende; sporefældning cremegul (☐☐☐☐☐☐); sporer 8-9,5 x 6-7 µm, bredt ellipsoidiske (Q 1,3-1,4). Hat 40-100 mm bred; lugt svag; sporer med noget forbundne vorter; almindelig **falmende skørhat (Russula depallens)**
Smag skarp i både lameller og hatkød; hat ± orange (☐☐☐☐☐☐), eventuelt med blegere hatmidte; stok ikke grånende; sporefældning orangegul (☐☐☐☐☐☐); sporer 7-8 x 6,5-7 µm, næsten-kugleformede (Q ca. 1,1). Hat 70-160 mm bred; lugt svag; sporer med isolerede vorter; meget sjælden og østlig **orange skørhat (Russula intermedia)**
18. I klitter og moser med pil; stok ikke gulnende; hat karminrød til vinrød (☐☐☐☐☐☐) med mørkere hatmidte (☐☐☐☐☐☐). Hat 20-40 mm bred; sporefældning cremegul; sporer 8-9 x 6,5-7,5 µm, med små, ret forbundne vorter; meget sjælden **Russula purpureofusca**
På andre voksesteder med poppel eller birk; stok gulnende; hatfarver lysere eller violette (☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐) 19
19. Med poppel; med lugt af pelargonie; sporer med tydeligt og tæt netornament. Hat 30-60 mm bred; sporefældning cremegul; sporer 7,5-9,5 x 6-7,5 µm; ej DK **Russula arpalices**
Med birk; lugt lidt frugtagtig eller manglende; sporeornament eventuelt mindre markant 20
20. Hat ± flammet med blandede pastelfarver (☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐); smag moderat skarp, ikke brændende. Hat 20-60 mm bred; lugt ubetydelig; stok gulnende; sporefældning dybt creme til cremegul; sporer 6-9 x 5-6,5 µm, ofte påfaldende aflange, med noget forbundne vorter; især i parker og haver; ret almindelig **foranderlig skørhat (Russula versicolor)**
Hat ret ensfarvet mørkviolet (☐☐☐☐☐☐); smag skarp. Hat 30-50 mm bred; lugt lidt frugtagtig; sporefældning cremegul; sporer (6,5-) 7-8 x 5-6 (-6,5) µm med netagtigt forbundne vorter; ej DK. **Russula unicolor**
21. Hat klart og ret ensartet rød (☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐), eventuelt hvidligt afblegende, men ikke brunorange eller rustpletlet; hathudshyernes endeceller med pålejret pigment 22
Hat broget, fx blandet rød, orange, brunorange, orangebrun, grønlig eller afbleget lyst brun (☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐), eventuelt mere ensfarvet rød og da rustpletlet; hathudshyernes endeceller uden pålejret pigment 24
22. Smag bittert kradsende, især på den bageste del af tungen, men ikke egentlig skarp; hat 40-140 mm bred; hathud af 3-4 µm brede hyfer med pålejret pigment, men uden hatcystider
..... se cinnoberrød skørhat (*Russula pseudointegra*), H30
Smag ± skarp, også på spidsen af tungen; hat 20-80 mm bred; hathud med 4,5-10 µm brede hathudscystider med pålejret pigment 23



23. Lugt ubetydelig eller lidt frugtagtig; hatoverside glat, ± skinnende, siden mat; sporefældning orangegul (☐☐☐☐☐☐); sporer 7,5-10 x 6,5-8 µm, med noget forbundne pigge. Hat 20-60 mm bred; med eg på fed bund; meget sjælden **pigeon-skørhat (Russula rutila)**
Lugt ± mel- til honningagtig; hatoverside ± dugget; sporefældning cremegul (☐☐☐☐☐☐); sporer 6,5-9 x 6-8 µm, med noget forbundne vorter. Hat 40-80 mm bred; med eg og bøg; meget sjælden og østlig **matrød skørhat (Russula rubra)**
24. Frugtlegerne brunende eller gulnende 25
Frugtlegerne uforanderligt eller grånende 28
25. Lamelsmag lidt skarp, andre dele mindre. Hat 20-50 mm bred; kød, stok og lameller ± gulnende; lugt svagt pelargonie- eller frugtagtig; sporefældning variabel, cremegul til orangegul; sporer 7-9 x 7-8 µm, med op til 1 µm lange, isolerede pigge; med løvtræer (avnbøg?); DK? **Russula versatilis**
Alle dele skarpe 26
26. Sporer 9,5-14 x 8-12 µm, med op til 1,5 µm høje, isolerede pigge. Hat 40-85 mm bred; lugt svagt frugtagtig; sporefældning orangegul; i løvskov; sjælden eller overset, østlig **storsporet skørhat (Russula globispora)**
Sporer 8-10 x 7-9 µm, med op til 1 µm høje, noget forbundne pigge 27
27. Sporer med op til 1 µm højt ornament; hatcystider nær randen i gennemsnit 5-7 µm brede. Hat 40-100 mm bred; lugt svagt frugtagtig; sporefældning orangegul; i løvskov; ret sjælden og østlig **pletlet skørhat (Russula maculata)**
Sporer med op til 0,6 µm højt ornament; hatcystider nær randen i gennemsnit 7-10 µm brede. Hat op til 100 mm bred; lugt ± frugtagtig eller af cedertræ; sporefældning orangegul; i løvskov; ej DK (sydlig, kendt fra Belgien, Frankrig og Spanien) **Russula nymphaeum**
28. Frugtlegerne ret spinkle; hat 20-50 mm bred. Hat 20-50 mm bred; lugt ubetydelig; sporefældning cremegul; sporer 6,5-8 x 5-6 µm, med op til 0,8 µm lange, stort set isolerede pigge; med bøg; meget sjælden og sydlig/østlig **zone-skørhat (Russula zonatula)**
Frugtlegerne robuste; hat oftest bredere end 50 mm 29
29. Hat ensfarvet eller flammet, ofte ± brun med pastelagtige, rosa og grønne indslag (☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐); stökkød ikke grånende; sporeornament af over 1 µm lange pigge 30
Hat ofte med en ydre brunrosa, koralrød til lyserød (☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐) zone og en mere gulligt (☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐) afbleget midte; stökkød eventuelt grånende; sporeornament af op til 1 µm lange pigge 31
30. Hatcystider med små, vorteagtige udvækster; lugt ubetydelig. Hat 40-70 mm bred; sporer 8-10 x 7-8,5 µm, med op til 1,5 µm lange, isolerede pigge; sporefældning orangegul; i løvskov; ret sjælden og østlig **kanel-skørhat (Russula cuprea)**
Haticystider uden vorter; lugt ubetydelig eller lidt frugtagtig. Hat 40-90 mm bred; sporer 8-10 x 6,5-8 µm, med op til 1,8 µm lange, isolerede pigge; sporefældning orangegul; i løvskov; ej DK **Russula vinosopurpurea**
31. Stok vedblivende hvid; lugt med alderen honningagtig; sporer 7-8,5 x 6-7 µm, med op til 1 µm lange, isolerede pigge; hatcystider flercellede; især med bøg. Hat mat; sporefældning orangegul; hist og her, men meget sjælden mod vest **blødkødet skørhat (Russula veternosa)**
Stok med alderen grånende; lugt ubetydelig; sporer 7-9,5 x 6,5-8 µm, med op til 1 µm lange, noget forbundne pigge; hatcystider encellede; især med eg. Hat 40-100 mm bred; sporefældning orangegul; meget sjælden og sydlig/østlig **grånende skørhat (Russula decipiens)**

